

Exercícios Objetivos

1. (2011)



O mapa mostra a área de ocorrência da malária no mundo. Considerando-se sua distribuição na América do Sul, a malária pode ser classificada como

- (a) endemia, pois se concentra em uma área geográfica restrita desse continente.
- (b) peste, já que ocorre nas regiões mais quentes do continente.
- (c) epidemia, já que ocorre na maior parte do continente.
- (d) surto, pois apresenta ocorrência em áreas pequenas.

(e) pandemia, pois ocorre em todo o continente.

2. (2015) *Euphorbia milii* é uma planta ornamental amplamente disseminada no Brasil e conhecida como coroa-de-cristo. O estudo químico do látex dessa espécie forneceu o mais potente produto natural moluscicida, a miliamina L.

MOREIRA, C. P. S.; ZANI, C. L.; ALVES, T. M. A. Atividade moluscicida do látex de *Synadenium carinatum* boiss. (Euphorbiaceae) sobre *Biomphalaria glabrata* e isolamento do constituinte majoritário. Revista Eletrônica de Farmácia, n. 3, 2010 (adaptado).

O uso desse látex em água infestada por hospedeiros intermediários tem potencial para atuar no controle da

- (a) dengue.
- (b) malária.
- (c) elefantíase.
- (d) ascaridíase.
- (e) esquistossomose.

**Gabarito**

1. A

2. E